Kopfschild rötelnd. Schienen und Tarsen der Vorder- und Mittelbeine schmutzig gelbrot. Vorder- und Mittelhüften mehr oder weniger dunkel bräunlichrot; Hinterhüften schwarz. Vorder- und Mittelschenkel mehr oder weniger gebräunt. Hinterste Schenkel braun oder fast schwarz. Hinterste Schienen gröfstenteils und hinterste Tarsen braun. Hinterleib in der Mitte etwas bräunelnd. Stigma graugelblich. Flügelschüppchen beim einen ♂ bleich, beim andern gelblich. — Länge des ♀: 6 + 3 mm, des ♂: 6 mm.

Beschrieben nach 1 ♀ und 2 ♂; davon das ♀ aus der Pfankuchschen Sammlung, bez.: Schlesien, Prof. Dittrich; die ♂ aus der Kriegerschen Sammlung, bez.: Rothenthal Erzgeb. 19. VII. 1892 Krieger l. und Rostock 28. VII. 1894 Krieger l.

Buprestides de l'Orient. (Col.)

(Russie méridionale, Asie mineure, Perse.)

Par **Ch. Kerremans.**

M. v. Bodemeyer m'a soumis une Série de *Buprestides* recueillis par lui même et par son fils en Russie, en Asie mineure et en Perse. Bien qu'il y ait relativement peu d'espèces nouvelles, je crois intéressant de donner la liste complète de ces récoltes, dans l'intérêt de l'étude de la répartition géographique des Buprestides. Je remercie M. v. Bodemeyer d'avoir bien voulu me communiquer ces espèces.

1. *Julodis onopardi* Fab., var. *lineigera* Mars., Konia (Asie mineure).
2. *Acmaeodera brevipes* Kies., Tschakit Thal (Asie mineure).
3. — *pilosellae* Bon., Tschakit Thal (Asie mineure).
4. — *ottomana* Friw., Tschakit Thal (Asie mineure).
5. — *flavolineata* Cast. et Gory, Tschakit Thal (Asie mineure).
6. — ***Bodoani* n. sp.** — Tschakit Thal (Asie mineure).
7. — *sedecimmaculata* Ab. — Lenkoran (Caucase); Tschakit Thal (Asie mineure).
8. — *taeniata* Fab., Tschakit Thal (Asie mineure).

8a. — — var. *flavofasciata* Pill., Lenkoran (Caucase).

9. — *Boryi* Brull., Lenkoran (Caucase); Luristan (Perse).

9a. — — var. *obscura* Reitt., Luristan (Perse).

10. — *cuprifera* Cast. et Gory, Luristan (Perse).
11. *Polyctesis Rhois* Mars., Tschakit Thal (Asie mineure).
12. *Ptosima undecimmaculata* Herbst, var. *cyclops* Mars., Lenkoran (Caucase); Biledjek (Asie mineure).

13. *Auriyena lugubris* Oliv., Tschakit Thal (Asie mineure).
14. *Capnodis cariosa* Pall., Tschakit Thal (Asie mineure).
15. *Sphenoptera Dejeani* Zubk., Sarepta (Russie mér.).
16. — *rugulosa* Fald., Désert salé (Asie mineure).
17. — ***Agrippina* n. sp.** — Luristan (Perse).
18. — *substriata* Kryn., Sarepta (Russie mér.).
19. — *basalis* Mor., Sarepta (Russie mér.).
20. *Dicerca alni* Fisch., Lenkoran (Caucase).
21. — *aenea* Lo., Lenkoran (Caucase).
22. *Poecilonata variolosa* Payk., Lenkoran (Caucase).
23. *Melanophila acuminata* De G., Tschakit Thal (Asie mineure).
24. *Anthaxia diadema* Fisch., Sarepta (Russie mér.); Lenkoran (Caucase); Sultan-Dagh (Asie mineure); Tschakit Thal (Asie mineure).
25. — *sponsa* Kies., Tschakit Thal (Asie mineure).
26. — *Passerinii* Pecch., Tschakit Thal (Asie mineure); Bulghar Maaden (Asie mineure).
27. — *nitidula* L., var. *signaticollis* Kryn., Goek-Dagh (Asie mineure); Sarepta (Russie mér.).
28. — *thalassophila* ab., Konia (Asie mineure); Sultan-Dagh (Asie mineure); Bulghar Maaden (Asie mineure); Goek-Dagh (Asie mineure).
28. — *lucens* Kust., Tschakit Thal (Asie mineure).
29. — *salicis* Fab., Goek Dagh (Asie mineure).
30. — *bicolor* Fald., Tschakit Thal (Asie mineure).
31. — *sepulchralis* Fab., Tschakit Thal (Asie mineure).
32. — *praeclara* Mann., Sarepta (Russie mér.); Tschakit Thal (Asie mineure).
33. — *cichorii* Ol., Sarepta (Russie mér.); Tschakit Thal (Asie mineure).
34. — ***Bodoani* n. sp.** — Tschakit Thal (Asie mineure).
35. — *inculta* Germ., Tschakit Thal (Asie mineure).
36. — *grammica* Cast. et Gory, Tschakit Thal (Asie mineure).
37. *Coraebus rubi* L., Tschakit Thal (Asie mineure).
38. — *elatus* Fab., Sarepta (Russie mér.); Tschakit Thal (Asie mineure).
39. *Melibaeus violaceus* Kies., Tschakit Thal (Asie mineure); Sultan-Dagh (Asie mineure).
40. — ***Bodemeyeri* n. sp.** — Tschakit Thal (Asie mineure).
41. *Agrilus laticornis* Illig., Lenkoran (Caucase).
42. — *angustulus* Illig., Sarepta (Russie mér.).
43. — *chrysoderes* ab., Tschakit Thal (Asie mineure).
44. — *sericans* Kies., Tschakit Thal (Asie mineure).
45. — *hyperici* Creutz., Tschakit Thal (Asie mineure).

46. *Agrilus Roberti* Chevrol., Konia (Asie mineure).
47. *Trachys pumila* Illig., Sarepta (Russie mér.).
48. — *puncticeps* ab., Lenkoran (Caucase).

Acmaeodera Bodoani n. sp.

Long. 8,5; larg. 3 mm. — Ressemble beaucoup à la variété *quadrifasciata* Rossi de l'*Acm. octodecimguttata* Piller, mais plus trapu, moins acuminé en arrière, les côtés du pronotum moins dilatés et moins arrondis avec les angles postérieurs de celui-ci moins obtus et presque droits; le front sans tache jaune, couvert d'une courte pubescence gris jaunâtre; les côtés du pronotum largement bordés de jaune, la ponctuation de celui-ci plus fine, plus régulière et plus dense, le sillon médian moins accentué. La base des élytres moins relevée en carène, la coloration de ceux-ci d'un noir profond, non bleuâtre, les stries plus fines, plus linéaires, à points moins grossiers, les interstries moins rugeux, les points unisériaux des interstries plus fins; les bandes jaunes ayant à peu près la même allure, mais avec une bande supplémentaire contre la base et interrompue des deux côtés vers le milieu de celle ci; l'armature postéro-marginale moins accentuée. Le dessous à peu près semblable, couvert d'une courte pubescence argentée et rare. — Asie mineure; vallée du Tschakit, un seul exemplaire (ma collection).

Sphenoptera Agrippina n. sp.

Long. 22; larg. 8 mm. — Robuste, acuminé en arrière, entièrement noir avec l'épisternum prothoracique et le métathoracique ainsi que les bords pointillés et pubescents des segments abdominaux cuivreux rosé. Très voisin de *cunea* Mars. pour le faciès, mais plus grand, plus élargi à l'épaule, le front avec deux vagues reliefs lisses et arqués, l'épistome très étroit et très court; le pronotum grand, atténué en arc de la base au sommet, les angles postérieurs aigus et embrassant les épaules, largement rebordé sur les côtés, le rebord limité intérieurement par un sillon rougeâtre et finement pointillé, le sillon médian net et bien marqué et n'atteignant pas le sommet, et, de chaque côté du disque, à égale distance du bord et du sillon médian, un sillon vague, formé par un amas de points plus fins et plus rapprochés du disque; les élytres déprimés à la région suturale, convexes à la base, obliquement atténués de la base au sommet, celui-ci conjointement arrondi et inerme avec un petit vide anguleux sutural, les stries régulières, formées de points fins et linéaires, les interstries plans, très finement et très vaguement pointillés; le menton tridenté; le prosternum à points épars, avec une vague

rangée de points de chaque côté ; d'abdomen presque lisse, vaguement pointillé avec une bordure marginale externe continue pointillée et pubescente. Les antennes et les tarses manquent. — Perse : Luristan, un seul exemplaire (ma collection).

***Anthaxia Bodoani* n. sp.**

Long. 5 ; larg. 2 mm. — Large, écourté, aplani, subparallèle sur les côtés, arrondi et subacuminé en arrière, tête obscure, opaque, verdâtre, parfois avec l'épistome et le bord des yeux vert clair ; pronotum presque noir, opaque, les angles postérieurs et les bords verts ; élytres pourprés, étroitement bordés de vert à la base, la nuance verte s'étalant plus ou moins autour de l'écusson ; dessous obscur, noirâtre ou verdâtre, un peu terne. La tête est large, très finement granuleuse ; le front vaguement déprimé ; les yeux saillants en dehors et dépassant les côtés du pronotum ; celui ci est court, un peu convexe sur le disque, déprimé dans les angles postérieurs qui sont aigus et très légèrement saillants en dehors, les côtés arqués en avant et subsinueux en arrière ; les élytres sont courts et très rugueux, à séries de gros points formant comme des stries avec les interstries granuleux ; la marge latérale postérieure avec une série de points plus épais mais inégaux limitant un rebord saillant ; le dessous plus finement ponctué que le dessus. — Asie mineure : vallée du Tschakit.

***Melibaeus Bodemeyeri* n. sp.**

Long. 3,5 ; larg. 1 mm. — Etroit, convexe, atténué en avant et en arrière, tête et pronotum bronzé cuivreux clair, élytres d'un noir profond, très brillant ; dessous noir, légèrement bronzé. Tête convexe, unie, finement ponctuée, les points très serrés ; le front très vaguement sillonné ; pronotum très convexe, sans carène prémarginale distincte, avec une dépression semicirculaire longeant la base et remontant sur les côtés, couvert de squamules entre des rides fines, circulaires et concentriques ; élytres finement granuleuses et subsquameuses avec le calus huméral saillant et le sommet séparément arrondi. Dessous glabre ; mentonnière du prosternum faiblement échancrée. — Asie mineure : vallée du Tschakit, un seul exemplaire (ma collection).